

КРОВЬ

<input type="checkbox"/>	54.200	Посев на аэробные и анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам* (чувствительность определяется только для аэробов)		9
<input type="checkbox"/>	54.201	Посев на аэробные и анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам* (чувствительность определяется только для аэробов)	+	

ОТДЕЛЯЕМОЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

<input type="checkbox"/>	Нос			
<input type="checkbox"/>	Зев			
<input type="checkbox"/>	Пазухи _____			
<input type="checkbox"/>	Другое _____			
<input type="checkbox"/>	54.205	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*	или	5
<input type="checkbox"/>	54.210	Посев на дифтерию*		
<input type="checkbox"/>	54.215	Посев на коклюш*	+	7
<input type="checkbox"/>	54.220	Посев на <i>N. meningitidis</i> с определением чувствительности к антибиотикам*		5
<input type="checkbox"/>	54.225	Посев на стрептококк пиогенный с определением чувствительности к антибиотикам*		
<input type="checkbox"/>	54.151	Посев на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антибиотикам*		
<input type="checkbox"/>	54.206	Посев на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) без определения чувствительности к антибиотикам*		
<input type="checkbox"/>	54.415	Посев на носительство метициллинрезистентных стафилококков (MRSA)		3

СОДЕРЖИМОЕ СТИЕРИЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ

<input type="checkbox"/>	Сустав			
<input type="checkbox"/>	Плевральная полость			
<input type="checkbox"/>	Брюшная полость			
<input type="checkbox"/>	Ликвор			
<input type="checkbox"/>	Другое _____			
<input type="checkbox"/>	54.107	Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя*		2-5**
<input type="checkbox"/>	54.250	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*	или	
<input type="checkbox"/>	54.255	Посев на <i>N. gonorrhoeae</i> (гонококк), с определением чувствительности к антибиотикам*		5
<input type="checkbox"/>	54.260	Посев на <i>N. meningitidis</i> с определением чувствительности к антибиотикам*	или	5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

<input type="checkbox"/>	54.435	Определение чувствительности к антибиотикам* дискодиффузионным методом (для тестов, где антибиотикограмма не предусмотрена)	7
<input type="checkbox"/>	54.180	Определение чувствительности к бактериофагам	7
<input type="checkbox"/>	54.106	Определение чувствительности к антимикотикам	5
<input type="checkbox"/>	54.430	Идентификация и определение чувствительности к антибиотикам* с использованием автоматизированной системы WalkAway 40Si	7

ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

<input type="checkbox"/>	54.280	Санитарно-бактериологические исследования на носительство MRSA	5
<input type="checkbox"/>	54.420	Посев на дрожжеподобные грибы (<i>Candida</i> и др.) с определением чувствительности к антимикотикам*	6
<input type="checkbox"/>	54.340	Исследование на анаэробную инфекцию	9
<input type="checkbox"/>	54.425	Посев на мицелийобразующие грибы	28

* – Чувствительность определяется при обнаружении возбудителя. Количество препаратов, к которым определяется чувствительность, зависит от выделенного этиологически значимого возбудителя. Идентификация микроорганизмов при бактериологических посевах определяется до вида.

К анаэробам, вирусам и мицелийобразующим грибам чувствительность к антибиотикам НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ.

** – Предварительное заключение - 1-2 дня. Окончательное заключение - 5 дней. **ВНИМАНИЕ:** в случае недостаточного количества микробных единиц в образце, определение антибиотикограммы на 2 сутки невозможно. В таких случаях в предварительном заключении указывается только тип окрашивания по Граму.

Специальные обозначения:

– флакон с транспортной средой на уреоплазмы-микоплазмы

– чашка с питательной средой

– флакон для посева крови и ликвора у взрослых, для выделения аэробных микроорганизмов

– контейнер стерильный объемом 30-60 мл

– флакон для посева крови и ликвора у взрослых и детей

– предметное стекло

– флакон для посева крови и ликвора у взрослых, для выделения анаэробных микроорганизмов

– контейнер пластиковый стерильный для кала

– транспортная система Эймса с углем

Всего количество исследований:

Ответственный за оформление бланка: _____ (подпись)

Сроки указаны в календарных днях, не учитывая день доставки биоматериала в Лабораторию!

<input type="checkbox"/>	54.107	Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя		2-5**
--------------------------	--------	---	--	-------

ОТДЕЛЯЕМОЕ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

<input type="checkbox"/>	Мокрота			
<input type="checkbox"/>	Бронхоальвеолярный лаваж, смыв, аспират			
<input type="checkbox"/>	Другое _____			
<input type="checkbox"/>	54.230	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*	или	5

БИОПТАТ ЖЕЛУДКА

<input type="checkbox"/>	54.240	Посев на <i>Helicobacter pilory</i> (3 биоптата) (В контейнер добавляют 5-15 мл стерильного физиологического раствора)	x 3	7
--------------------------	--------	--	-----	---

ГРУДНОЕ МОЛОКО

<input type="checkbox"/>	Левая молочная железа			
<input type="checkbox"/>	Правая молочная железа			
<input type="checkbox"/>	54.265	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*		5

Отделяемое, пораженная ткань, трансудат, экссудат, пунктат, выпот, отделяемое ран, инфильтратов, абсцессов, другое

<input type="checkbox"/>	Ткань, биоптат			
<input type="checkbox"/>	Трансудат			
<input type="checkbox"/>	Экссудат			
<input type="checkbox"/>	Отделяемое ран			
<input type="checkbox"/>	Отделяемое инфильтратов			
<input type="checkbox"/>	Отделяемое абсцессов			
<input type="checkbox"/>	Другое _____			
<input type="checkbox"/>	54.245	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*		5
<input type="checkbox"/>	54.130	Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (чувствительность определяется только для аэробов)	или	9
<input type="checkbox"/>	54.300	Посев ногтевых пластинок на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотикам*		5
<input type="checkbox"/>	54.107	Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя	или	2-5**